

# Рекомендации по применению Метосепт и Витанорм в повседневной практике

[mv.64z.ru](http://mv.64z.ru)

## Внутренний приём

### Основное направление – лечебно-профилактическое

При этом учитывается вес и рост пациента:

- при весе до 80 кг и среднем росте принимать по 1 капсуле Метосепт и Витанорм 2 раза в день, непосредственно перед приёмом пищи;
- при весе до 100 кг - по формуле : "1+1" - 3 раза в день или "1+1"-утром и "2+2" - вечером;
- при весе свыше 100 кг - по формуле "1+1" - утром и в обед и "2+2" перед ужином. Возможно изменение: "2+2" – утром и "2+2" – вечером.

При этом нельзя ни коим образом забывать об обязательном приёме воды, (вода должна быть некипяченой, негазированной и чистой, лучше – природной. Всё остальное – это или электролиты или пищевые растворы, у них другие функции.)

Рост учитывается:

- если при большом росте вес недостаточен – тогда дозировка требует увеличения;
- если при малом росте вес излишен – учитывается в первую очередь вес.

### Лечебное применение

Лечебные дозировки применяются в тех случаях, когда заболевание требует конкретики:

- базовый курс применения составляет 3 (три) месяца и позволяет избавиться от большего числа половозрелых особей и патогенно-опасных личинок;
- клинически достоверно применение повышенных дозировок при обострениях хронических заболеваний и критических состояниях в острых периодах;
- в каждом отдельном случае дозировка подбирается для конкретного пациента на определённый период, после чего проводится регулярная коррекция величины дозы.

Наиболее точный подбор возможен при использовании приборных методик в основе которых лежат частотно-резонансные характеристики, например: "Вега-Тест", "Тест-Фолль", "Тест-Система модульной диагностики". Достаточно достоверными являются биолокационные методики;

- дозировки для детей также зависят от веса и роста ребенка, хотя основная ориентировка зависит от возраста. Дети с двенадцати лет пользуются дозировками для взрослых.

Остальные рекомендации даются по следующей схеме:

- |       |             |                    |
|-------|-------------|--------------------|
| от 0  | До 1 года - | 1/16 капсулы;      |
| от 1  | До 2 лет -  | 1/8 капсулы;       |
| от 2  | До 4 лет -  | 1/4 капсулы;       |
| от 4  | До 6 лет -  | 1/4 -1/2 капсулы;  |
| от 6  | До 10 лет - | 1/2 – 2/3 капсулы; |
| от 10 | До 12 лет - | 2/3 –1 капсулы.    |

Эта дозировка является суточной, прием желательно разделить на 2 раза.

- в случаях, когда у пациента выявлена аллергическая реакция на отдельные компоненты препаратов или проявляется непереносимость (с болевым, например, составляющим), дозировка уменьшается вплоть до гомеопатического значения;
- приём может осуществляться и в виде отвара, для чего одна капсула Метосепт (её содержимое) заливается одним литром кипятка, накрывается и настаивается 45-60 минут, который после этого готов к применению.

Внутри (местно) отвар применяется, кроме вышеперечисленных случаев:

- при урогенитальных проблемах, как жидкость для спринцевания;
- при запорах и других проблемах толстого кишечника, в отвар добавляется в виде порошка одна капсула Витанорм;
- при заболеваниях внутреннего уха отваром смачивается ватно-марлевый тампон и вкладывается в ушной канал на время от 25 до 45 минут. Процедуру следует прекратить при появлении чувства жжения;
- при инфекционно-паразитарных заболеваниях дёсен и полости рта рекомендуется, смоченные в отваре ватно-марлевые тампоны закладывать за верхнюю и нижнюю губы на 15-30 минут. Процедуру, также, прекращают при ощущении жжения.

## **Наружное применение Метосепт (в жидком виде) и**

### **Витанорм (в виде порошка или в виде кашицы)**

Рекомендуется:

- при кожных заболеваниях; при высыпаниях на коже, вызванных приёмом препаратов – протирать отваром поврежденные поверхности кожи несколько раз в сутки, приём местных и общих ванн с добавлением отвара: в случае наличия гнойничков, после протирания отваром, посыпать порошком Витанорм затем, минут через 30-45, убрать образовавшуюся корочку;
- при наличии кожных образований (папиллом, кандилем, бородавок, родинок и т.д. ) – протирать отваром или смазывать кашицей из Метосепт до получения результата;
- при грибковых повреждениях поверхности кожи и ногтевых пластин – применять местные ванны, а ногтевые пластины покрывать кашицей на несколько часов (в случае появления жжения – снять повязки и смыть);
- при появлении зуда – протирать поверхности отваром;
- при появлении болей в суставах – делать примочки или компрессы, убирать при появлении жжения;
- при поражениях волосяного покрова головы – втирать в кожу с легким массажем, не допуская подтекания отвара и попадания в глаза, после чего накрыть голову колпаком для душа или тюрбаном из махрового полотенца;
- при непереносимости препарата при внутреннем приёме, в качестве процедуры, помогающей преодолеть непереносимость, применять общие ванны с постепенным увеличением концентрации отвара;
- при витилиго – рекомендуется приём вовнутрь с применением общих ванн.

Заказ и доставка Метосепт, Витанорм, Бактрум, Максифам, Фомидан и других препаратов  
компании Оптисалт:

**8(800)333-77-10 | 8(499)673-33-95 | 8(903)723-08-62**